

BCG-ID

OBS.: O Ministério da Saúde suspende a indicação da 2ª dose da Vacina BCG-ID
tuberculose

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa. A lesão inicial, em 95 dos casos, ocorre nos pulmões, constituindo o foco primário.

A tuberculose continua sendo importante problema de saúde pública. No Brasil, estima-se que 35 a 40 milhões de pessoas estejam infectadas; são aproximadamente 100 mil casos novos por ano. O número de mortes é de quatro a cinco mil por ano.

O agente infeccioso é um bacilo, o bacilo de Koch ou *Mycobacterium tuberculosis*.

Fonte de infecção:

Considera-se como fonte de infecção o indivíduo que elimina grandes quantidades do bacilo no escarro: são os bacilíferos. O gado bovino e outros mamíferos também são considerados fontes de infecção.

Um indivíduo bacilífero, quando não submetido a tratamento, infecta cerca de cinco a 10 pessoas por ano e, de maneira geral, se mantém bacilífero por dois anos, até a recuperação espontânea, a cronificação da doença ou a morte.

Idade da Aplicação:

- Recomendação Especial
RECÉM NASCIDO
ACIMA DE 2KG

Pápula

(15 a 30 minutos após aplicação)

Nódulo Eritematoso

(2 a 3 semanas após aplicação)

Abcesso e Úlcera

(1 a 6 meses após aplicação)

Cicatriz

(10% a 20% dos vacinados

podem não apresentar cicatriz)