

Difteria

Difteria é uma doença infecciosa, popularmente conhecida como “crupe”, causada pela toxina de uma bactéria que se localiza nas amígdalas, faringe, laringe ou na pele. Quando se instala nas vias respiratórias superiores caracteriza-se pelo aparecimento de uma ou várias placas acinzentadas, circundadas por uma zona inflamatória de cor vermelho-mate, que podem obstruir a passagem do ar, provocando asfixia e morte.

Período de incubação

O período de incubação é de um a seis dias, podendo ser mais longo.

Período de transmissibilidade

A transmissão ocorre enquanto houver bacilos nas secreções e lesões, durando, em média, de duas a quatro semanas. Com antibioticoterapia adequada a transmissibilidade cessa 24 a 48 horas depois de iniciado o tratamento do

doente ou do portador.

A imunidade pode ser naturalmente adquirida pela passagem de anticorpos maternos: as crianças cujas mães são imunes apresentam imunidade que vai decrescendo até mais ou menos os seis meses.

A doença não confere imunidade permanente, por isto, após a cura, o paciente deve iniciar ou completar o esquema de vacinação. A imunidade adquirida pelo soro ou pela imunoglobulina antidiftérica é transitória.

Fonte: FUNASA

Idade Aplicação:

1º dose

2º mês de vida

2º dose

4º mês de vida

3º dose

6º mês de vida

1º reforço

1 ano e 03 meses

2º reforço

entre 4-6 anos de idade

3º reforço

15 anos de idade

Adulto:

dose de reforço a cada 10 anos