

## **EVENTOS ADVERSOS APÓS A VACINAÇÃO**

A ocorrência de algum evento adverso após a vacinação (por exemplo, doenças ou sintoma leve ou grave) pode ser causada pela vacina, pois nenhuma delas é totalmente isenta de riscos.

Com grande frequência, entretanto, o que ocorre é uma associação temporal entre sintoma, doença e aplicação da vacina, sem relação, causa efeito.

Fonte Funasa

### **SITUAÇÕES POSSÍVEIS DE CONTRA-INDICAÇÃO À IMUNIZAÇÃO:**

- Pessoas com imunodeficiência adquirida ou congênita;
- Pessoas acometidas por neoplasias malignas;
- Reação alérgica à aplicação anterior a vacina;
- Em tratamento com corticosteróides em altas doses e tratamento durante 2 semanas ou mais;
- Na vigência de estados febris agudos, para que seus sinais e sintomas não sejam confundidos com possíveis efeitos adversos das vacinas;
- Após transfusões sanguíneas e de hemoderivados (sangue total, plasma e gamaglobulina), deve-se aguardar de 6 a 8 semanas para retornar ao esquema de vacinação.

### **NÃO CONSTITUEM CONTRA-INDICAÇÃO À IMUNIZAÇÃO:**

- Tosse e/ou coriza;
- Doenças neurológicas estáveis (convulsão controlada);
- Diarréia leve ou moderada;
- Crianças internada;
- Infecções virais leves;
- Tratamento com corticóide em doses não elevadas por curto período (inferior a duas semanas);
- Prematuridade ou baixo peso ao nascimento (peso acima de 2 kg);
- Doenças alérgicas com asma e rinite.

**ESTAS ORIENTAÇÕES SÃO SUJEITAS A MUDANÇAS.  
SEGUIR SEMPRE A RECOMENDAÇÃO DE SEU PEDIATRA**