

## Febre Amarela

Doença causada por um vírus do gênero Flavivirus, transmitida ao ser humano pela picada de mosquitos infectados.

Doença endêmica na África e América do Sul

Estima-se que aproximadamente 200.000 pessoas sejam infectadas com o vírus da febre amarela, com 30.000 mortes por ano no mundo

Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP)

O Viajante deverá ser vacinado no mínimo 10 dias antes de sua viagem para estar protegido contra a febre amarela.

Essa vacina terá validade de 10 dias, devendo ser novamente administrada após 10 anos se houver risco de exposição. A validade do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) corresponderá ao tempo de validade da vacina.

Vacinação obrigatória

É importante que o calendário vacinal esteja em dia. Porém, atualmente, a única vacina que é exigida para viagens internacionais é a vacina contra febre amarela. Para isso, é necessário que o viajante vacine-se dias antes da data da viagem e observe se o seu cartão de vacina está completamente preenchido e sem rasuras.

Para agilizar seu atendimento nos centros, o viajante poderá realizar seu pré-cadastro no site [www.anvisa.gov.br/viajante/](http://www.anvisa.gov.br/viajante/) e informar-se sobre os cuidados de saúde para tornar a sua viagem mais segura.

Para agilizar seu atendimento o Certificado Internacional de Vacinação e profilaxia (CIVP) é necessário:

- Documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento para menores de idade.
- Cartão de vacina com nome, fabricante e lote completo da vacina, assinatura e nome do vacinador e identificação da unidade de vacinação.
- Presença do interessado para assinatura do CIVP no local.

**NA CLÍNICA FASTER A VACINAÇÃO E O COMPROVANTE SEMPRE SÃO FORNECIDOS COM A DATA DA VACINAÇÃO – EVITE ABORRECIMENTOS.**

Contra-indicações da vacina contra Febre Amarela:

Stamaril não deve ser aplicada em indivíduos imunossuprimidos (Pacientes com AIDS, leucemia, linfoma, outras neoplasias malignas ou aqueles cujas respostas imunogênicas são suprimidas por corticóides, medicamentos citotóxicos ou radiação. Paciente com reação de hipersensibilidade ao ovo, proteína de

galinha, a qualquer componentes da vacina STAMARIL ou hipersensibilidade grave (anafilaxia) após dose anterior de vacina contra a febre amarela.

Idade da aplicação:

1º dose – Crianças acima de 09 meses de idade em áreas endêmicas.

Em situações de surto a vacinação de crianças entre 6 e 8 meses pode ser considerada.

- Mulheres Grávidas é necessário avaliação minuciosa da relação risco/benefício
- Indivíduos de 60 ano de idade ou mais pode ocorrer maior incidência de eventos adversos severos indesejáveis.

Dose única para 10 anos de proteção

O viajante deverá ser vacinado no mínimo 10 dias antes da viagem para estar protegido contra febre amarela