

Vacina contra hepatite B

A Hepatite B o contágio se dá, principalmente, através de contato com o sangue contaminado e prática de sexo, com pessoas portadoras do vírus da hepatite B. A Hepatite B no Brasil mata 04 vezes mais do que a Aids. Existem Vacinas combinadas para Hepatite A e B, para Hepatite A adulto e Infantil e Hepatite B para adultos e pediátricos.

A Hepatite B o contágio se dá, principalmente, através de contato com o sangue contaminado e prática de sexo, com pessoas portadoras do vírus da hepatite B. A Hepatite B no Brasil mata 04 vezes mais do que a Aids. Existem Vacinas combinadas para Hepatite A e B, para Hepatite A adulto e Infantil e Hepatite B para adultos e pediátricos.

O PNI recomenda atualmente a vacinação universal das crianças contra hepatite B. Quando não for aplicada na unidade neonatal, a vacina deve ser feita na primeira consulta ao serviço de saúde. Pode ser aplicada simultaneamente

com a vacina BCG.

Nas áreas de alta prevalência, deve-se também vacinar as crianças com seis-sete anos de idade, por ocasião da

entrada na escola, caso não tenham registro de esquema vacinal completo contra a hepatite B. De modo semelhante,

pode ser aplicada simultaneamente com o BCG.

Outros grupos priorizados para a vacinação são os grupos de risco, compreendendo hemofílicos, usuários de hemodiálise, portadores de outras doenças que implicam alto risco de transfusões de sangue ou utilização de produtos

sangüíneos, profissionais de saúde, comunicantes domiciliares de portadores, reclusos e participantes de outras comunidades

fechadas, prostitutas e homossexuais masculinos.

A vacinação da população com zero-14 anos de idade em áreas de alta endemicidade, sob a forma de campanhas,

deve ser implantada e mantida a cada ano, considerando o risco da transmissão da infecção nessas regiões, desde os

primeiros anos de vida.

Idade de aplicação

Iniciar de preferência logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, para evitar a transmissão vertical. Caso isso não tenha sido possível, iniciar o mais precocemente possível, na unidade neonatal ou na primeira visita ao Posto de Saúde. A vacina contra hepatite B pode ser administrada em qualquer idade e simultaneamente com outras vacinas do calendário.

Via de administração

Intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa; em crianças com mais de dois anos de idade, pode ser aplicada na região deltóide. Não deve ser aplicada na região glútea, pois a adoção desse procedimento se associa com menor produção de anticorpos, pelo menos em adultos.

Idade da aplicação

1º dose – ao nascer

2º dose – 30 dias ou combinada no 2º mês de vida

3º dose - 6º mês de vida

1º reforço – Avaliar os nível protetores após 10 anos

Adulto devem ser vacinados, principalmente os grupos de riscos para Hepatite B