

### Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
<b>A partir de 20 anos</b>	dT (Dupla tipo adulto) <b>(1)</b>	1ª dose	Contra Difteria e Tétano
	Febre amarela <b>(2)</b>	dose inicial	Contra Febre Amarela
	SCR (Tríplice viral) <b>(3)</b>	dose única	Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
<b>2 meses após a 1ª dose contra Difteria e Tétano</b>	dT (Dupla tipo adulto)	2ª dose	Contra Difteria e Tétano
<b>4 meses após a 1ª dose contra Difteria e Tétano</b>	dT (Dupla tipo adulto)	3ª dose	Contra Difteria e Tétano
<b>a cada 10 anos, por toda a vida</b>	dT (Dupla tipo adulto) <b>(4)</b>	reforço	Contra Difteria e Tétano
	Febre amarela	reforço	Contra Febre Amarela
<b>60 anos ou mais</b>	Influenza <b>(5)</b>	dose anual	Contra Influenza ou Gripe
	Pneumococo <b>(6)</b>	dose única	Contra Pneumonia causada pelo pneumococo

**(1)** A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir o esquema acima. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

**(2)** Adulto/idoso que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem.

**(3)** A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.

**(4)** Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.

**(5)** A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.

**(6)** A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.