

sarampo

## Os adultos devem tomar a vacina

O sarampo caracterizado por febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e eritema máculo-papular (manchas pequenas, avermelhadas e elevadas na pele) e enantema típico (pontos avermelhados e esbranquiçados na boca e garganta). Pode causar complicações como otite, pneumonia (pelo próprio vírus do sarampo ou secundariamente, por bactérias) e encefalite (acometimento do sistema nervoso central). O sarampo geralmente é mais grave em desnutridos, gestantes, recém-nascidos e pessoas portadoras de imunodeficiências. Em gestantes, pode causar abortos espontâneos e parto prematuro,

O sarampo é uma doença viral aguda, altamente contagiosa.

Os principais sintomas são: febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, mal estar geral, coriza, conjuntivite e tosse com catarro. A doença pode evoluir com complicações, como a broncopneumonia e outras que muitas vezes podem ser fatais, principalmente em crianças desnutridas.

O sarampo continua sendo uma doença comum em várias partes do mundo.

Em março de 2006, o primeiro surto de sarampo ocorreu na Venezuela após quatro anos de controle da doença. No continente europeu ocorreram casos, mais recentemente, na Alemanha e na Espanha.

Estes surtos alertam para a necessidade de proteção contra o sarampo aos viajantes brasileiros antes de sua viagem, pois é grande a chance de se expor à infecção ao viajar para áreas de risco e de ocorrer casos de sarampo importados ou relacionados à importação no país.

A vacina contra o sarampo é a medida de prevenção mais eficaz. No calendário nacional de vacinação de rotina a primeira dose deve ser administrada a toda criança de um ano de idade e uma segunda dose àquelas de cinco a seis anos de idade.

Recomenda-se que os adultos nascidos depois de 1960, sem comprovação de nenhuma dose, recebam pelo menos uma dose da vacina tríplice viral (SCR).

Esta vacina não é recomendada a gestantes.

A vacina tríplice viral (SCR) que protege contra o sarampo, protege também contra a rubéola e a caxumba.

## SARAMPO — VACINAÇÃO DE VIAJANTES

Os viajantes devem estar com suas vacinas em dia antes de viajar.

O viajante deve receber a vacina tríplice viral 15 dias antes de viajar, para a sua completa proteção e de seus familiares.

No presente, são consideradas áreas de risco para viajantes brasileiros os países da Europa onde o sarampo está com surtos epidêmicos em evidência, isto é, na Alemanha, Espanha e, na região das Américas, a Venezuela.

A relação dos postos de vacinação, para viajantes que se destinam às áreas de risco, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cve.saude.sp.gov.br>.

Fonte Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Funasa

IDADE DA APLICAÇÃO:

A partir de 12 meses de vida.

Reforço entre 4 e 6 anos de idade