

Vacina contra Febre Tifóide

A febre tifóide é uma doença bacteriana causada pela *Salmonella typhi* e está relacionada a baixos níveis sócio-econômicos, de saneamento, higiene pessoal e ambiental.

A vacina contra febre tifóide é indicada para os viajantes que vão circular por áreas em que a qualidade da água e dos alimentos são precários; No Brasil nas regiões Norte e Nordeste.

A vacina é indicada para quem vai trabalhar ou praticar turismo ecológico ou alternativo em regiões com precárias condições de saneamento básico nas áreas endêmicas da doença: África, Sudeste Asiático, México, Bolívia e países da Costa Andina (com exceção do Chile).

O modo de transmissão da doença é por via feca-oral, principalmente, através da ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes humanas ou urina contendo a *S. typhi*. Pode ser transmitida também pelo contato direto (mão-boca) com fezes, ruína, secreção respiratória, vômito ou pus de um indivíduo infectado.

Sinais e Sintomas

Doença que se caracteriza por febre alta (39 -40°), dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, diarreia e tosse seca, podendo aparecer manchas rosadas no tronco.

Complicações

As Complicações mais comuns são enterorragia e perfuração intestinal, que geralmente ocorrem em pessoas não tratadas.

Principais condutas de prevenção

Ferver ou filtrar a água antes de consumi-la, prevenir-se com higiene pessoal, saneamento básico e preparo adequado dos alimentos, evitar alimentação na rua e, se necessário, dar preferência a pratos preparados na hora, por fervura, e servidos ainda quentes.

Idade da aplicação:

1º dose – Crianças acima de 24 meses de idade em áreas de risco: África,

Vacina indicadas em situações de risco

Internacionalmente conhecida como Typhim Vi